

## Vorbereitung MRT Dünndarm Sellink

Sehr geehrte(r) Patient(in)!

Bei Ihnen ist die Durchführung einer Magnetresonanztomographie des Dünndarms geplant. Um eine gute Untersuchungsaussage zu erzielen ist es erforderlich, dass Sie die nachfolgenden Empfehlungen berücksichtigen und durchführen.

- Bitte am Untersuchungstag **4 Stunden** vor dem Termin nicht mehr essen.
- Bitte lösen Sie den Ihnen ausgehändigten Beutel Pulver in 2 Liter Wasser (ohne Kohlensäure) auf und trinken Sie ihn kontinuierlich schluckweise. Bitte beginnen Sie damit zwei Stunden vor der Untersuchung zuhause und beenden Sie es evtl. auf dem Weg zur Praxis.
- Eine Stunde vor der MRT Untersuchung bitte nicht mehr die Toilette aufsuchen!
- Für diese Untersuchung ist eine Gabe des Medikaments Buscopan erforderlich. Bitte machen Sie unser Personal darauf aufmerksam, wenn Sie unter Grünem Star oder Prostatahyperplasie leiden. Bitte kommen Sie in Begleitung, da sie nach der Gabe von Buscopan nicht mehr aktiv am Straßenverkehr teilnehmen dürfen.

Die Mannitol-Lösung dient der besseren Darstellung des Dünndarms. Sie kann leicht abführend wirkend.

Sollten Sie an schwerer Herzschwäche oder Nierenfunktionsstörung leiden bzw. Dialysepatient sein, so informieren Sie uns bitte bei der Anmeldung zur Untersuchung rechtzeitig hierüber.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.  
Das Praxisteam